	โรงพยาบาลไทยเจริญ		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารที่	หน้า จาก 10
	เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา	TCH-WI-ICC-002	
		แก้ไขครั้งที่	เริ่มใช้วันที่
	2	(.....)	
	คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล	
ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้:		
(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล) ประธานกรรมการ ICC	(นพ.ภู่างธรรม เกิดสวัสดิ์) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ		

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาโรคในโรงพยาบาล
2. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาล

ขอบเขต

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. หัวหน้างานพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
3. บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาลไทยเจริญที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดความ

ผู้ป่วยที่ Colonized หรือติดเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมพิเศษ เชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด ดังต่อไปนี้

1. Pseudomonas aeruginosa ที่คือต่อยา Colistin
2. Acinetobacter baumannii ที่คือต่อยา Colistin
3. Stenotrophomonas maltophilia ที่คือต่อยา Co-trimoxazole และ Levofloxacin
4. Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) เช่น เชื้อ E.coli, Klebsiella pneumoniae ที่คือต่อยา Imipenem, Meropenem, หรือ Doripenem
5. Vancomycin-Resistant Enterobacteriaceae (VRE) เช่น เชื้อ Enterococcus faecium ที่คือต่อยา Vancomycin เป็นต้น
6. Staphylococcus Aureus ที่คือต่อกลุ่มยา Methicillin เช่น (MRSA) Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus



โรงพยาบาลไทยเจริญ

<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา</p>	<p>เอกสารที่</p> <p>TCH-WI-ICC-002</p>	<p>หน้า จาก 10</p>
	<p>แก้ไขครั้งที่</p> <p>2</p>	<p>เริ่มใช้วันที่</p> <p>(.....)</p>
<p>คณะผู้จัดทำ:คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ</p>	<p>หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ :.....</p> <p>(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)</p> <p>ประธานกรรมการ ICC</p>	<p>ผู้อนุมัติใช้:</p> <p>(นพ.ภู่อารงธรรม เกิดสวัสดิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ</p>	

7. Extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing เป็นกลุ่มเชื้อที่สร้างเอนไซม์ ที่ต่อต้านยา กลุ่ม Cephalosporin ได้แก่ E.coli ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL เป็นต้น

กระบวนการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

กระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ
1.การเฝ้าระวัง	<p>1. ห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อดื้อยา ปฏิชีวนะ โดยรายงานชื่อเชื้อ พร้อมลักษณะของเชื้อ ว่าเป็น ESBL CRE หรือ MDR</p> <p>2.การรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ให้มีการส่งต่อสื่อสารในกรณี ผู้ป่วยดื้อยา เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน SHIP อย่างเคร่งครัด</p> <p>3.ผู้ป่วยที่มีประวัติการพบเชื้อดื้อยา เมื่อกลับเข้ามารักษาใหม่ใน โรงพยาบาลในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจพบเชื้อต้อง ได้รับการแยกไว้ก่อนตามหลัก SHIP จนกว่าจะตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อดังกล่าว</p> <p>4. ผู้ป่วยที่มีประวัติการพบเชื้อดื้อยา เมื่อมาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก ให้ได้รับการตรวจตามปกติ แต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษา ภายใต้หลักป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามหลัก SHIP อย่างเคร่งครัด ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันตรวจพบเชื้อ</p>



โรงพยาบาลไทยเจริญ

วิธีปฏิบัติงาน

เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดีดื้อยา

เอกสารที่

TCH-WI-ICC-002

หน้า จาก 10

แก้ไขครั้งที่

2

เริ่มใช้วันที่

(.....)

คณะผู้จัดทำ:คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ผู้ตรวจสอบ :.....

ผู้อนุมัติใช้:

(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)

(นพ.ภูมิจันทร์ธรรม เกิดสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ ICC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ

	<p>5. แพทย์เจ้าของไข้ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยตามความเหมาะสม</p> <p>6. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่แจ้งข้อมูลรับ-ส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูลและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามหลัก SHIP อย่างเคร่งครัด</p>
2.การให้การพยาบาลและดูแลผู้ป่วย	<p>1. การแยกผู้ป่วยอยู่ในห้องเดี่ยวที่มีห้องน้ำในตัวเพื่อจำกัดพื้นที่</p> <p>2.กรณีห้องเดี่ยวไม่เพียงพอ ให้จัดอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Cohort) และควรมีเชื้อเดียวกัน</p> <p>3.ห้ามจัดให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ</p> <p>4.บุคลากรทุกคนที่เข้าไปให้บริการแก่ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามหลัก SHIP อย่างเคร่งครัด</p> <p>5.การราวน์ข้างเตียงควรจำกัดคนที่เข้าไปร่วมตรวจให้เหลือน้อยเท่าที่จำเป็น</p> <p>6.ห้ามนำแฟ้มประวัติผู้ป่วยเข้าไปในห้องแยกหรือบริเวณเตียงผู้ป่วยที่มีเชื้อ</p> <p>7.จัดให้มี Alcohol เจลล้างมือที่ปลายเตียงผู้ป่วยทุกราย</p>
3.การแยกอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย	<p>1.มีการจัดทำกล่อง SHIP Box ซึ่งประกอบด้วย</p>



โรงพยาบาลไทยเจริญ

<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา</p>	เอกสารที่	หน้า จาก 10
	TCH-WI-ICC-002	
	แก้ไขครั้งที่	เริ่มใช้วันที่
	2	(.....)
<p>คณะผู้จัดทำ:คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ</p>	<p>หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ :.....</p> <p>(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)</p> <p>ประธานกรรมการ ICC</p>	<p>ผู้อนุมัติใช้:</p> <p>(นพ.ภูารงธรรม เกิดสวัสดิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - ปรอทวักซ์ใช้ดีจิตอล การทำความสะอาดให้เช็ดด้วย 70% หรือ Alcohol 2.5% Umonium - Stethoscope การทำความสะอาดให้เช็ดด้วย 70% Alcohol หรือ 2.5% Umonium - เครื่องวัด BP การทำความสะอาดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * Cuff BP เช็ดและซักด้วยผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของ sodium hypochlorite เช่น น้ำยาไฮเตอร์สำหรับซักผ้าสี (ป้องกันการกัดสี) * สายและเครื่องวัด BP ให้เช็ดด้วย 70% Alcohol หรือ 2.5% Umonium - เครื่องวัด O2sat การทำความสะอาดให้เช็ดด้วย 70% Alcohol หรือ 2.5% Umonium 2. แยกถังผ้าและถังขยะติดเชื้อพิเศษสำหรับผู้ป่วยไว้ที่ข้างเตียงผู้ป่วย ให้ใช้ถุงสีแดง 3. แยกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเต็ม ได้แก่ Urinal, bed pan, กะละมัง เช็ดตัว
4. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน / หอผู้ป่วยอื่นที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปให้ทราบล่วงหน้า 2. พนักงานเปลเตรียมน้ำยาทำความสะอาดเปล ได้แก่ 70% Alcohol หรือ 2.5% Umonium



โรงพยาบาลไทยเจริญ

วิธีปฏิบัติงาน

เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

เอกสารที่

TCH-WI-ICC-002

หน้า จาก 10

แก้ไขครั้งที่

2

เริ่มใช้วันที่

(.....)

คณะผู้จัดทำ:คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ผู้ตรวจสอบ :.....

ผู้อนุมัติใช้:

(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)

(นพ.ภูวรงค์ธรรม เกิดสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ ICC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ


	<p>3.พนักงานเวรเปลใส่ PPE ให้ครบ ได้แก่ ถุงมือ 2 คู่ เสื้อกาวน์ และสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)</p> <p>4.หอบุ๋ยป่วยในเมื่อรับทราบ case ดื้อยาเตรียมสถานที่แยกสำหรับผู้ป่วย เตรียมเปิดประตูหอบุ๋ยป่วย ประตูห้องแยกรอ</p> <p>5.เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จแล้วให้ถอดถุงมือชั้นที่ 1 และให้ทำความสะอาดเปลด้วยน้ำยาที่เตรียมมา ถอดถุงมือและเสื้อกาวน์ ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ ล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนออกจากหอบุ๋ยป่วย</p>
<p>5.เจ้าหน้าที่ X-ray</p>	<p>1.ให้เลิกใช้วิธีการ X-ray เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยดื้อยาเป็นลำดับแรก (ยกเว้นกรณีที่เป็นให้พิจารณาเป็นราย)</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ X-ray เตรียมน้ำยาทำความสะอาดเปล ได้แก่ 70%Alcohol หรือ 2.5% Umonium</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ X-ray ใส่ PPE ให้ครบ ได้แก่ ถุงมือ 2 คู่ เสื้อกาวน์ และสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)</p> <p>4.เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ถอดถุงมือชั้นที่ 1 และให้ทำความสะอาดเครื่อง X-ray ด้วยน้ำยาที่เตรียมมา ถอดถุงมือและเสื้อกาวน์ ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ ล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนออกจากหอบุ๋ยป่วย</p>
<p>6.การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1.จัดให้มีการทำความสะอาดวันละ 1 ครั้ง เวรเช้า</p> <p>2.พนักงานผู้ช่วยหรือคนไข้มีหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบเตียงผู้ป่วย</p>



โรงพยาบาลไทยเจริญ

<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา</p>	<p>เอกสารที่</p> <p>TCH-WI-ICC-002</p>	<p>หน้า จาก 10</p>
	<p>แก้ไขครั้งที่</p> <p>2</p>	<p>เริ่มใช้วันที่</p> <p>(.....)</p>
<p>คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ</p>	<p>หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ :</p> <p>(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)</p> <p>ประธานกรรมการ ICC</p>	<p>ผู้อนุมัติใช้:</p> <p>(นพ.ภูารงธรรม เกิดสวัสดิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ</p>	

	<p>3.สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้ครบ ได้แก่ ถุงมือ เสื้อกาวน์ และสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)</p> <p>4. การทำความสะอาดบริเวณแยกหรือห้องแยกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย ได้แก่ เตียง ปุ่มปรับเตียง สวิตซ์ไฟ โต๊ะข้างเตียง เก้าอี้ Over bed ปุ่มเปิดพัดลม เช็ดน้ำยา 70%Alcohol หรือ 2.5%Umonium</p>
<p>7.การสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ</p>	<p>1.ทำ Pop up alert ในระบบ HoxP</p> <p>2.ติดป้ายเตือนด้วยสัญลักษณ์ SHIP ที่หน้า Chart, เปลนอน, รถนั่ง, ใบัติดกรอง</p> <p>3.ที่ตึกผู้ป่วยในมีการแขวนป้าย Contract precaution ที่เตียงผู้ป่วย</p> <p>4.ในกรณีที่มีการนัดติดตามให้ติดสัญลักษณ์ SHIP ที่บัตรนัด</p>
<p>8.การปลดสถานะผู้ป่วยดื้อยา</p>	<p>1.หลังรับการรักษา ได้รับยาปฏิชีวนะครบ ไม่มีแผล ไม่มีสายระบายชนิดต่าง ๆ เมื่อครบ 3 เดือนหลังตรวจเจอเชื้อ พิจารณายกเลิก Contract Precaution และยกเลิก Pop up alert ในระบบ HosxP +++</p> <p>เมื่อผู้ป่วยไม่มีแผล ไม่มีสายระบายชนิดต่าง และไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ พิจารณายกเลิก Contract Precaution ดังนี้</p> <p>2.ไม่พบเชื้อจากตำแหน่งที่มีการติดเชื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจพิจารณาทำ RSC เฉพาะเชื้อใน bowel ไม่จำเป็นต้องทำทุกราย</p> <p>2.1 VRE เมื่อเพาะเชื้อจากตำแหน่งที่มีการติดเชื้อและจากทวารหนัก (rectal swab) ไม่พบเชื้อติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์</p>

	โรงพยาบาลไทยเจริญ		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารที่	หน้า จาก 10
	เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา	TCH-WI-ICC-002	
		แก้ไขครั้งที่	เริ่มใช้วันที่
	2	(.....)	
	คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล	
ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้:		
(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล) ประธานกรรมการ ICC	(นพ.ภู่อารธรรม เกิดสวัสดิ์) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ		

	<p>2.2 Gram-negative (เช่น CRE, XDR ฯลฯ) เมื่อเพาะเชื้อจากตำแหน่งที่มีการติดเชื้อ และจากทวารหนัก (Rectal swab) ไม่พบเชื้อ 3 ครั้งและแต่ละครั้งห่างกัน 3 วัน</p> <p>2.3 เชื้ออื่น ๆ เช่น A.baumannii, Pseudo, MRSA ไม่ต้อง Rectal swab ให้เพาะเชื้อจากตำแหน่งที่ต้องการเก็บซ้ำ หากเชื้อไม่ขึ้นให้ปลดสถานะได้</p> <p>**ข้อเสนอแนะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติและจัดการทรัพยากรเท่านั้นผู้ป่วยบางรายอาจจะกลับมามีเชื้อใหม่ได้ ดังนั้นบุคลากร จึงต้องยึดหลัก Standard precaution อย่างเคร่งครัด</p>
--	--



โรงพยาบาลไทยเจริญ

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา	เอกสารที่ TCH-WI-ICC-002	หน้า จาก 10
	แก้ไขครั้งที่ 2	เริ่มใช้วันที่ (.....)
คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล	
ผู้ตรวจสอบ : (พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล) ประธานกรรมการ ICC	ผู้อนุมัติใช้: (นพ.ภู่างรรถม เกิดสวัสดิ์) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ	



โรงพยาบาลไทยเจริญ

<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา</p>	เอกสารที่	หน้า จาก 10
	TCH-WI-ICC-002	
	แก้ไขครั้งที่	เริ่มใช้วันที่
	2	(.....)
<p>คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ</p>	<p>หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ :</p> <p>(พญ.สุทธิดา นวนพรัตน์สกุล)</p> <p>ประธานกรรมการ ICC</p>	<p>ผู้อนุมัติใช้:</p> <p>(นพ.ภู่อารธรรม เกิดสวัสดิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ</p>	

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลไทยเจริญ





โรงพยาบาลไทยเจริญ

วิธีปฏิบัติงาน

เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

เอกสารที่

TCH-WI-ICC-002

หน้า จาก 10

แก้ไขครั้งที่

2

เริ่มใช้วันที่

(.....)

คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติใช้:

(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)

(นพ.ภู่อารงธรรม เกิดสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ ICC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ที่	หัวข้อประเมิน	ปฏิบัติถูกต้อง	ปฏิบัติไม่ถูกต้อง	ไม่ปฏิบัติ
หมวดที่ 1 S=SINGLE ใช้คนเดียว ไม่ใช้ร่วมกัน				
1.	แยกอุปกรณ์ของใช้อย่างชัดเจน เช่น ปรอท เครื่องวัด BP กระจกเช็ดตัว ถังทำความสะอาดเตียง ผ้าเช็ดเตียง			
2	ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน เพราะสบู่ก้อนจะไม่ค่อยแห้ง ทำให้เกิดการสะสมเชื้อโรคได้			
3	ผ้าทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยส่งซักและอบแห้งที่โรงซักฟอก			
4	เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งหลังปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล			
หมวดที่ 2 H = Hand hygiene มือสะอาด				
1	บุคลากรล้างมือก่อนทำกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ			
2	ผู้ป่วยและญาติล้างมือก่อนและหลังการเยี่ยมผู้ป่วยได้ถูกต้อง			
3	ติดตั้ง Alcohol hand rub ไว้ประจำเตียง/หน้าห้องผู้ป่วย/ในห้องผู้ป่วยและรกรให้การพยาบาลอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการใช้			
หมวดที่ 3 I =Isolation แยกห้องผู้ป่วย แยกอุปกรณ์				
1	แยกผู้ป่วยในรายที่สงสัยและในรายที่ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลโดยมีห้องแยกโรค			
2	กรณีไม่มีห้องแยกโรคหรือห้องแยกโรคเต็ม ต้องแยกให้เตียงผู้ป่วยอยู่ห่างกันอย่างน้อย 3 ฟุตและกั้นม่านระหว่างเตียง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม			
3	แยกอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องใช้ต่าง ๆ			
หมวดที่ 4 P = PROMOTION ส่งเสริมให้รู้จัก ทำจริง				
1	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของญาติและผู้ดูแลก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วย			
2	ให้คำแนะนำโดยพยาบาลประจำหอผู้ป่วย แนะนำข้อปฏิบัติแก่ญาติและผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา			
3	ให้เอกสารสื่อความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาแก่ผู้ป่วยและญาติ			
หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย				
1	มีการติดป้ายไว้ที่ห้องผู้ป่วย เพื่อให้ญาติทราบข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยม			
2	ล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนและหลังเข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกครั้ง			
3	ห้ามใช้ภาชนะ อุปกรณ์ของผู้ป่วยร่วมกับผู้ป่วยรายอื่น ให้การดูแลเฉพาะญาติของตน			



โรงพยาบาลไทยเจริญ

<p>วิธีปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา</p>	<p>เอกสารที่</p> <p>TCH-WI-ICC-002</p>	<p>หน้า จาก 10</p>
	<p>แก้ไขครั้งที่</p> <p>2</p>	<p>เริ่มใช้วันที่</p> <p>(.....)</p>
<p>คณะผู้จัดทำ: คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ</p>	<p>หน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบ :</p> <p>(พญ.สุทธิภา นวนพรัตน์สกุล)</p> <p>ประธานกรรมการ ICC</p>	<p>ผู้อนุมัติใช้:</p> <p>(นพ.สุรพงษ์ธรรม เกิดสวัสดิ์)</p> <p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลไทยเจริญ</p>	

4	หากผู้ป่วยรายอื่นขอความช่วยเหลือ ต้องล้างมือก่อนและหลังทุกครั้งหรือเรียกเจ้าหน้าที่			
5	เชื่อมตามเวลาที่กำหนดและไม่ให้เด็กเล็ก ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำเข้าเยี่ยม			
หมวดที่ 6 การปฏิบัติเมื่อพบเชื้อดื้อยา				
1	แบบแผ่น SHIP มากับแฟ้ม ใบส่งตัว หรือใบ admit ผู้ป่วย			
2	มีการแจ้งประสานระหว่างหน่วยงานก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกครั้ง			
3	บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันได้ตามแนวทางที่กำหนด			

ชื่อผู้ป่วย.....เตียง.....HN.....AN.....วันที่.....ผู้ประเมิน.....